

Tropfplan für die geplante Augenoperation: Crosslinking

Werte Patientin, werter Patient,

für eine optimale Vorbereitung und Nachsorge bitten wir Sie, folgenden Tropfplan einzuhalten.

Da manche Augentropfen wegen Lieferengpässen gelegentlich nicht lieferbar sind, finden Sie - jeweils kursiv geschrieben - die entsprechenden Ersatzpräparate (*Substitute*) unten aufgeführt.

Gleichen Sie den Tropfplan also bitte mit den ausgestellten Rezepten ab.

Applizieren Sie bitte nicht alle Tropfen gleichzeitig und beachten Sie für die gewünschte Wirksamkeit einen **zeitlichen Mindestabstand von ca. 15 Minuten** zwischen den Tropfgaben.

VOR der Operation für das zu operierende Auge

Zeitraum	Präparat bzw. <i>Substitut</i>	Dosierung	Intervall
2 Wochen vor OP	HYLO Care <i>Remogen Omega</i>	1 Tropfen	3x täglich
2 Tage vor OP	Floxal EDO	1 Tropfen	5x täglich

NACH der Operation für das zu operierende Auge

	Zeitraum	Präparat	Dosierung	Intervall
Mit der Verbandskontaktlinse im Auge	Direkt nach OP	Novalgin Tropfen	orale Einnahme/siehe Packungsbeilage	
		Novesine (*)	max. 6-8 Tropfen innerhalb 24 Std. bei starken Schmerzen (kühl lagern)	
	bis zwei Tage nach OP	Ibuprofen	400mg	3x täglich
	ca. 2 Wochen	Floxal Salbe	in den Bindehautsack mit 10 Minuten Abstand	
		Prednisolon Salbe		
Bis 3 Monate nach OP	Vitamin C	Nach Bedarf	Nach Bedarf	
	HYLO Care			
	<i>Remogen Omega</i>			
Nach Entnahme der Verbandskontaktlinse	1 Woche	Floxal EDO	1 Tropfen	5x täglich
	1 Woche	Dexa EDO	1 Tropfen	5x täglich
	4 Wochen			3x täglich
				dann monatl. um 1 Tropfen reduzieren

Bringen Sie bitte eine Begleitperson und eine Sonnenbrille mit.

Ich bestätige Kenntnisnahme und Erhalt einer Kopie dieses Tropfplans.

.....
Datum

.....
Refraktivmanagement

.....
Patient/Patientin