

Tropfplan für die geplante Augenoperation: ICL - Implantation

Werte Patientin, werter Patient,

für eine optimale Vorbereitung und Nachsorge bitten wir Sie, folgenden Tropfplan einzuhalten.

Da manche Augentropfen wegen Lieferengpässen gelegentlich nicht lieferbar sind, finden Sie - jeweils kursiv geschrieben - die entsprechenden Ersatzpräparate (*Substitute*) unten aufgeführt.

Gleichen Sie den Tropfplan also bitte mit den ausgestellten Rezepten ab.

Applizieren Sie bitte nicht alle Tropfen gleichzeitig und beachten Sie für die gewünschte Wirksamkeit einen **zeitlichen Mindestabstand** von ca. **15 Minuten** zwischen den Tropfengaben.

VOR der Operation für das zu operierende Auge

Zeitraum	Präparat bzw. <i>Substitut</i>	Dosierung	Intervall
2 Wochen vor OP	Remogen Omega	1 Tropfen	3x täglich
	<i>Thealoz Duo</i>		
2 Tage vor OP	Nevanac	1 Tropfen @ 3mg/ml 1 Tropfen @ 1mg/ml	1x täglich 3x täglich
	<i>Acular</i>	1 Tropfen	3x täglich
	<i>Ketorolac</i>		
	Ofloxacin Ophtal	1 Tropfen	5x täglich

6 Stunden vor der Operation gilt unabhängig von der Anästhesieform das **Nüchternheitsgebot**, in denen Sie weder essen noch trinken sollen. Bis 2 Stunden vor dem Eingriff sind allerdings vereinzelt Schlücke Wasser zur Medikamenteneinnahme erlaubt.

NACH der Operation für das zu operierende Auge

Zeitraum	Präparat bzw. <i>Substitut</i>	Dosierung	Intervall
Bis 5 Tage nach OP	Ofloxacin Ophtal	1 Tropfen	5x täglich
Bis zu 4 Wochen nach OP	Nevanac	1 Tropfen @ 3mg/ml 1 Tropfen @ 1mg/ml	1x täglich 3x täglich
	<i>Acular</i>	1 Tropfen	3x täglich
	<i>Ketorolac</i>		
	<i>Remogen Omega</i>	Nach Bedarf	Nach Bedarf
	<i>Thealoz Duo</i>		

Ich bestätige Kenntnisnahme und Erhalt einer Kopie dieses Tropfplans.

.....
Datum

.....
Refraktivmanagement

.....
Patient/Patientin